



9 ساعات



يمكن شرب الماء العادي



تفاصيل الموعد

يُرجى ترتيب موعد قبل يومين على الأقل من تاريخ إجراء التحليل.

للحجز يُرجى الاتصال بـ SA Pathology على الرقم 8222 3000.

سيستغرق الموعد حوالي نصف ساعة.

التاريخ _____


الوقت _____

مراكز التحاليل

لمعرفة مواقع مراكز التحاليل وساعات الدوام زوروا موقعنا www.sapathology.sa.gov.au أو اتصلوا على الرقم 8222 3000 (08)

لمزيد من المعلومات

إذا كانت لديكم أي أسئلة، يُرجى الاتصال باستعلامات SA Pathology على الرقم 8222 3000.



ان من المهم في أي تحليل طبي ان لا تتداخل عوامل أخرى فتؤثر على نتيجة التحليل، لذلك يُرجى منكم قراءة التعليمات التالية واتباعها بشكل دقيق.

التحضير

- يجب الصوم لمدة 9 ساعات قبل التحليل، وهذا يعني الامتناع تماماً عن تناول أي طعام.
- يمكن شرب ماء عادي الى حد ساعة واحدة قبل إجراء التحليل.

ما يجب ان تجلبوه معكم

- ان من الضروري ان تجلبوا معكم الآتي:
- قائمة بجميع الأدوية التي تتناولونها حالياً مع جرعة كل دواء
- بطاقة مديكير.

طريقة أخذ العينة

- يتوجب تناول كبسولة مع مقدار 80 مليلتر تقريباً من الماء.
- سيتم بعد 15 دقيقة توجيهكم خلال عملية أخذ العينة من خلال النفخ في قسبة.

الأدوية

تستخدم الأدوية المذكورة في أدناه حالياً فيما يتعلق بالقضاء على جرثومة المعدة *H. pylori*. ستؤثر بعض هذه الأدوية على نتيجة تحليل الزفير باليوريا، لذلك يجب إيقاف تناولها قبل إجراء التحليل وكما هو موضح في أدناه.

أنظمة القضاء على الجرثومة – يتم إيقافها قبل 4 اسابيع.

يجب إيقاف تناول الأدوية التالية وإيقاف جميع المضادات الحيوية والمضادات البكتيرية، بغض النظر عما إذا كان تناولها جزء من علاج القضاء على جرثومة *H. pylori* أو يتم تناولها لأي سبب آخر، وذلك قبل 4 أسابيع على الأقل من إجراء التحليل.

Nexium HP7، Klacid HP7

مثبطات مضخة البروتون – يتم إيقافها قبل 7 أيام.

يجب إيقاف تناول أي مثبطات مضخة بروتون قبل 7 أيام على الأقل من إجراء التحليل حتى لو كان تناولها جزء من علاج القضاء على جرثومة *H. pylori*. مثل الأدوية التالية:

(Lanzaprazole (Zoton) (الخ)، (Omeprazole (Losec, Acimax) (الخ)،

(Esomeprazole (Nexium) (الخ)، (Pantoprazole (Somac) (الخ)،

(Rabeprazole (Pariet) (الخ).

مضادات مستقبلات الهيستامين – يتم إيقافها قبل 9 ساعات.

يجب إيقاف تناول أي مضادات مستقبلات هيستامين قبل 9 ساعات على الأقل من إجراء التحليل. مثل الأدوية التالية:

(Cimetidine (Magicul) (الخ)، (Ranitidine (Zantac) (الخ)،

(Nizatidine (Tazac) (الخ)، (Famotidine (Pepcid, Pepcidine) (الخ).

مضادات الحموضة – يتم إيقافها عند الصوم

مضادات الحموضة و Mylanta و Gaviscon يمكن تناولها في اليوم الذي يسبق التحليل، ولكن ليس بعد البدء بالصوم.