



9 ساعت



آب ساده می توانید بنوشید



جزئیات گرفتن وقت

لطفاً حداقل دو روز قبل از آزمایش وقت بگیرید.

برای وقت گرفتن با شماره تلفن 8222 3000 با پتالوژی استرالیای جنوبی تماس بگیرید.

وقت آزمایش شما شما تقریباً نیم ساعت طول خواهد کشید.

تاریخ: _____

وقت: _____

مراکز مراجعه مریض


برای موقعیت های مراکز مراجعه مریض و تازه ترین ساعات کاری آنها به وب سایت ما

www.sapathology.sa.gov.au

مراجعه کنید یا به 8222 3000 (08) تماس بگیرید.

معلومات بیشتر

اگر سوالی دارید، لطفاً از طریق شماره تلفن 8222 3000 با بخش معلومات پتالوژی استرالیای جنوبی تماس بگیرید.



This document has been reviewed and endorsed by SQCAG* for consumers and the community – November 2019.
*SA Health Safety and Quality Community Advisory Group

در هر آزمایش طبی مهم است که عوامل دیگر در آن دخالت نداشته باشد. لطفاً هدیایات زیر را به دقت بخوانید و دنبال کنید.

آمادگی

- قبل از آزمایش باید 9 ساعت در حال روزه داری باشید، این بدان معناست که غذا نخورید.
- می توانید تا 1 ساعت قبل از این آزمایش آب ساده بنوشید.

چه باید با خود بیاورید

ضروری است که این چیزها را با خود بیاورید:

- شما باید یک کپسول را همراه با تقریباً 80 میلی لیتر آب قورت کنید.
- مدیکر کارت.

شیوه جمع آوری

- يتوجب تناول كبسولة مع مقدار 80 ملليلتر تقريباً من الماء.
- 15 دقيقة بعد شما در مورد اجرای عمل جمع آوری هدايت خواهيد شد که شامل پف کردن در یک نی می گردد.

دوا

دوای ذکر شده در زیر در حال حاضر در ارتباط با ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود. بعضی از دواها بر نتیجه آزمایش یوربای تنفس تأثیر می گذارد، بنابراین قبل از آزمایش باید مصرف آنها را همانطور که در زیر نشان داده شده است متوقف کنید.

رژیم های ریشه کنی - 4 هفته قبل.

شما باید حداقل چهار (4) هفته قبل از آزمایش تان، مصرف دوای زیر و همه آنتی بیوتیک ها یا آنتی باکتریا ها را، چه به عنوان بخشی از درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری یا به هر دلیل دیگر توصیه شده است، قطع کنید.

Nexium HP7، Klacid HP7

بازدارنده های پمپ پروتون - 7 روز قبل.

شما باید حداقل هفت (7) روز قبل از این آزمایش، مصرف هرگونه بازدارنده های پمپ پروتون را متوقف کنید، حتی اگر آنها بخشی از تداوی ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری باشند. مثالهای آنها عبارتند از:

Lanzaprazole (Zoton) و غیره)، (Omeprazole (Losec, Acimax) و غیره)،
(Nexium) و Esomeprazole (Nexium) و غیره)، (Pantoprazole (Somac) و غیره)،
(Pariet) و Rabeprazole (Pariet) و غیره).

آنتاگونیست های گیرنده H2-9 ساعت قبل.

حداقل (9) ساعت قبل از این آزمایش شما باید مصرف آنتاگونیست های گیرنده H2 را متوقف کنید. مثالها عبارتند از:

Ranitidine (Zantac) و غیره)، (Cimetidine (Magicul) و غیره)،
(Tazac) و Nizatidine (Tazac) و غیره)، (Famotidine (Pepcid, Pepcidine) و غیره).

آنتی اسیدها - وقتی که خوردن غذا را متوقف می کنید، مصرف آنها را توقف دهید.

از دوای ضد اسید مانند Mylanta و Gaviscon می توان یک روز قبل از این آزمایش استفاده کرد، اما بعد از شروع توقف خوردن غذا باید متوقف شود.